

查出 67例甲状腺癌,病理学分类: 36例乳头状癌, 18例滤泡性癌, 11例间变性或巨细胞癌, 1例甲状腺肉瘤, 另一例分类不明。从¹³¹I使用到甲状腺癌确诊的平均时间为 15年。受照 5年以后甲状腺癌的总危险是 1.35(95% CI 1.05~ 1.71), 疑甲状腺肿瘤受检者的危险显著高于其它原因受检者。前者标准化发病比(SIR)= 2.86, 后者 SIR= 0.75, 但两者都未见剂量反应关系。¹³¹I检查后 5~ 9年间危险最高。2408例小于 20岁受检者中, 只发现 3例甲状腺癌(SIR= 1.69), 其受检年龄在 15~ 19岁间。1764例其它原因受检儿童, 发生 2例甲状腺癌(SIR= 1.38)。疑为肿瘤受检的男性患者危险显著高于女性, 其它原因受检的男性, 未发现甲状腺癌。

结论: 成人诊断性使用¹³¹I, 发生甲状腺癌的危险似乎很轻微; 儿童使用¹³¹I诊断诱发甲状腺癌与短时间内同样剂量的外照射作用相比小 2~ 10倍。

(吴莹摘 田俊芝 杨天恩校)

135 婴儿期因皮肤血管瘤放射治疗诱发的乳腺癌 [英] /Lundell M... // Radiat Res. -1996, 145(2). -225~ 230

方法: 9675例有皮肤血管瘤的女婴儿, 放疗时平均年龄 6个月, 50%以上的患者是 40年代治疗的。血管瘤 45%位于头、颈部, 19%在胸部, 治疗用²²⁶Ra敷贴器或针、X射线和³²P治疗次数平均 1.6次(1~ 37次)。用 6个月婴儿的人体模型模拟过去的照射治疗, 以热释光剂量计测量不同器官的剂量。其它治疗剂量取自原资料。依乳腺吸收剂量(D)分为 4组(≤ 0.01 Gy, 0.02~ 0.10 Gy, 0.11~ 1.0 Gy和 > 1.0 Gy)。卵巢吸收剂量(D)分 3组(≤ 0.01 Gy, 0.02~ 0.10 Gy和 > 0.10 Gy)。受照后的时间(T)分 4组(< 30年, 30~ 39年, 40~ 49年和 ≥ 50年)。

结果: 乳腺平均吸收剂量 0.39 Gy (< 0.01~ 35.8 Gy)。首次受照 < 6个月的婴儿, 平均乳腺吸收剂量 0.42 Gy(≤ 0.01~ 32.0 Gy), 其余的为 0.35 Gy(≤ 0.01~ 35.8 Gy)。卵巢平均吸收剂量 0.05 Gy (< 0.01~ 8.6 Gy), 并随受照者身体大小而不同。1958~ 1986年间, 发现 75例乳癌(SIR= 1.24, 95% CI 0.98~ 1.54)。诊断时平均年龄 44岁(25~ 63岁)。发生癌肿的乳房平均吸收剂量 1.5 Gy (< 0.01~ 35.8 Gy)。除 1例用 X射线(≤ 60 kVp)照射治疗外, 其他病例都曾用²²⁶Ra敷贴器治疗。受照后的时间是唯一具有统计学显著影响的因素, 受照时年龄和卵巢的吸收剂量与此无显著联系。超额相对危险(ERR)最合适的估算模式是:

$$ERR = 0.030D \exp \{ 0.166(T - 30) \} \\ (0.048) \quad (0.069)$$

式中下边圆括号的数字是标准误。以此模式估算 1 Gy 的 ERR 为 0.38(95% CI 0.09~ 0.85)。ERR 随照后时间以每年近 18% (95% CI 4%~ 32%) 的速度增加, EAR(超额绝对危险)以相似的方式随受照后时间而增加。对随访 50 年以上的妇女, 每 1 Gy 的 ERR 为 2.25(95% CI 0.59~ 5.6), EAR 为 22.9 / (10⁴乳房·年·戈瑞)。该研究进一步证实女婴乳腺原基对电离辐射敏感。

(吴莹摘 田俊芝 杨天恩校)

136 塑壳手表氡辐射的吸收 [英] /Brunner P... // Health Phys. -1996, 70(4). -484~ 486

氡在民用上主要作为自发光源用于手表等日用消费品上。近年来氡作为永久光源用于塑壳手表盘上的数量日益增多。由于氡具有高度渗透性, 流行病学调查表明前列腺癌的增多与氡的内照射有关。故调查了来自塑壳手表的氡辐射。

方法: 被检手表的氡以氡化聚苯乙烯形式存在, 其初始含量为 200~ 300 MBq。为了测量氡从手表塑壳中的释放, 将 82 种不同型号的防水表先在水浴中浸渍 24 小时, 然后用液闪和 β 射线能谱仪测量了水中氡浓度。此外, 还平行测量了 108 位塑壳手表佩戴者(佩戴时间 1~ 2 年, 每天 2~ 24 小时不等)尿中的氡浓度。作为对照组 5 名志愿者(在研究开始时尿中不含氡)亦检测了佩戴手表后及除去后尿中氡浓度。

结果: 水中氡浓度为 110~ 1620 000 Bq/d, 平均 24 400 Bq/d, 且水中氡浓度与塑壳手表在水中浸渍时间长短存在线性关系。佩戴手表者尿中氡的平均浓度为 197~ 1133 Bq/L, 约为不佩戴者的 10 倍。5 位志愿者每天戴表 24 小时, 39 天后, 其尿中氡浓度逐渐升高, 去表后逐渐下降。来自塑壳手表的氡辐射对全身剂量虽可忽略不计, 但经皮肤的吸收相当可观, 为 ICRP 建议的公众剂量限值的 3~ 4 倍。

可见, 在消费者无法确定塑壳手表的放射性含量, 而手表仍然是常规的消费物品的情况下, 建议至少应强制推行将带有放射性手表予以特别标记和隔离存储的措施。

(王崇道摘)

137 放疗和烷化剂增加了儿童期癌症患者发生骨癌的危险 [英] /Hawkins MM... // J Natl Cancer Inst. -1996, 88(5). -270~ 281

儿童期癌症患者发生第二次原发性癌症以骨癌